



THU PHÂN, TẠO NỀN MỚI VÀ TÁCH ĐÀN

1. Thu phân trùn

Khi sinh khối gần chạm ống thở của thùng trùn là lúc chúng ta tiến hành thu phân trùn và tách đàn, dĩ nhiên bạn có thể thu sớm hơn. Nhưng theo kinh nghiệm của chúng tôi và đã thiết kế ở ống thở thì ống thở thùng trùn đến đáy thùng sâu 20 cm, khi sinh khối gần chạm ống thở là lúc lượng phân đủ nhiều, đủ tốt (trùn có thời gian phân hủy đủ thời gian).



H1: Khi sinh khối gần chạm 2 ống thở thì thu phân trùn

Cách đơn giản: Gạt 5-7 cm lớp trên cùng của sinh khối (trùn thường sống ở lớp này) sang 1 bên thùng, sau đó bóc phân bên dưới. Có thể lẫn 1 ít trùn ở lớp phân dưới, bạn có thể bỏ lại thùng hoặc cứ mang bón cho cây, rồi tưới ẩm. Trùn có trong phân sẽ tiếp tục sống trong đất cày xới, giúp đất tơi xốp hơn.

Cách chuyên nghiệp: Dùng 1 cái bạt để ngoài nắng mạnh, đổ sinh khối trùn ra bạt thành mô như sóng trâu. Trùn sợ ánh sáng sẽ chui hết xuống dưới, dùng tay gạt phân từ đỉnh sang 2 bên thì đóng ở giữa là trùn, còn phần gạt 2 bên là phân. Sau khi thu phân xong, làm lại bước **“Tạo nền nuôi mới”** rồi bóc thả đống trùn ở giữa bạt vào nuôi tiếp.



H2: Cách thu phân chuyên nghiệp

2. Tạo nền nuôi mới

Sử dụng lại lưới cũ vẫn dùng. Dùng mụn sơ dừa ngâm nước vắt kiệt (thường dùng 1 bánh sơ dừa ngâm 1lít nước) + ít giấy vụn, lá khô, 1 ít vỏ trứng nghiền nhỏ (nếu có) rồi rải 1 lớp dày 5-6 cm vào đáy thùng. Sau đó thả trùn sinh khối lên.

3. Tách đàn

Sau 1 thời gian nuôi (khoảng 2-3 tháng), đàn trùn sinh sản có thể lên gấp đôi, khi những con trùn to bắt đầu bỏ thùng đi (bò ra ngoài). Lúc đó chúng ta chia đôi lượng trùn, tạo nền nuôi mới rồi bốc bớt trùn ra để nuôi sang 1 thùng khác. Hoặc chúng ta có thể chia trùn cho người khác, bán lại ... để giảm lượng trùn trong thùng xuống và tiếp tục nuôi tiếp.